RECOVER-19 - Réhabilitation fonctionnelle et respiratoire et soin nutritionnel des patients atteints de la COVID-19

Responsable(s) :Alix Lilian

Date de modification : 26/03/2021 | Version : 1 | ID : 74005

Général

Identification

Nom détaillé	Réhabilitation fonctionnelle et respiratoire et soin nutritionnel des patients atteints de la COVID-19
Sigle ou acronyme	RECOVER-19

Thématiques générales

Domaine médical	Maladies infectieuses Médecine interne Médecine physique et de réadaptation Pneumologie
Etude en lien avec la Covid-19	Oui
Mots-clés	COVID-19; réentrainement; rééducation; réadaptation

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable	Alix
Prénom	Lilian
Adresse	CHU de Rennes

Collaborations

Financements

Financements	Publique

Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	CHU de Rennes
Statut de l'organisation	Secteur Public
Existence de comités scientifique ou de pilotage	Oui

Contact(s) supplémentaire(s)	
Caractéristiques	
Type de base de données	
Type de base de données	Autres
Préciser	Etude prospective multicentrique
Critère de sélection des participants	Autre traitement ou procédure
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	Oui
Précisions	Intervention au niveau individuel
Objectif de la base de données	
Objectif principal	Déterminer l'efficacité d'un parcours de soins multidisciplinaire personnalisé (comportant une réadaptation à l'effort, une réhabilitation respiratoire si nécessaire et une stratégie thérapeutique nutritionnelle) sur la qualité de vie (composante physique du SF-36) des patients atteints de la COVID-19.
Critères d'inclusion	-Patient majeur défini comme cas confirmé de la COVID-19 ayant été hospitalisé ou non pour COVID-19 -Date du début des premiers symptômes de la COVID-19 ? 4 semaines et < 4 mois -Patients présentant un déficit fonctionnel et/ou respiratoire et/ou une asthénie et/ou une dénutrition, persistant(s) au delà de 4 semaines des premiers symptômes de la COVID-19 : o Augmentation du score de dyspnée de l'échelle mMRC ? 1 entre le mois précédant la COVID-19 et au-delà des 4 premières semaines post-COVID-19 et/ou o Score d'asthénie > 22 selon l'échelle de Pichot au-delà des 4 premières semaines post-COVID-19, en l'absence d'asthénie présente dans le mois précédant la COVID-19 (score d'asthénie selon l'échelle de Pichot <8) et/ou o Perte de poids déclarée > 5% en moins de 6 mois, en comparant le poids minimum du patient au cours

	du mois précédant la COVID-19 et son poids au-delà des 4 premières semaines post-COVID-19 et/ou o IMC actuel < 20 (si âge < 70 ans) ou < 22 (si âge ? 70 ans) si l'IMC était ? 20 (si âge < 70 ans) ou ? 22 (si âge ? 70 ans) au cours du mois précédant la COVID-19
Type de population	
Age	Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans) Personnes âgées (65 à 79 ans) Grand âge (80 ans et plus)
Population concernée	Sujets malades
Pathologie	B99-B99 - Autres maladies infectieuses
Sexe	Masculin Féminin
Champ géographique	National
Collecte	
Dates	
Année du premier recueil	2020
Année du dernier recueil	2021
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	< 500 individus
Détail du nombre d'individus	160
Données	
Activité de la base	Collecte des données active
Type de données recueillies	Données cliniques Données déclaratives Données paracliniques Données biologiques Données administratives Données de coût
Modalités	

Suivi des participants	Oui

Valorisation et accès

Valorisation et accès

Accès