

- PrimInject: cross-sectional study on the patterns and practices of drug use in France

Responsable(s) :Arwidson Pierre
Guignard Romain
Guichard Anne

Date de modification : 19/09/2017 | Version : 1 | ID : 73177

Général

Identification

Nom détaillé PrimInject: cross-sectional study on the patterns and practices of drug use in France

Thématiques générales

Domaine médical Infectious diseases

Déterminants de santé Addictions
Lifestyle and behavior

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Arwidson

Prénom Pierre

Adresse 12, rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice cedex

Email pierre.arwidson@santepubliquefrance.fr

Organisme Santé publique France

Nom du responsable Guignard

Prénom Romain

Adresse 12, rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice cedex

Téléphone 0171801575

Email romain.guignard@santepubliquefrance.fr

Organisme Santé publique France

Nom du responsable Guichard

Prénom Anne

Organisme

Université Laval, Québec

Collaborations

Participation à des projets, des réseaux, des consortiums

No

Financements

Financements

Public

Précisions

Inpes

Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur

Santé publique France

Statut de l'organisation

Secteur Public

Existence de comités scientifique ou de pilotage

Yes

Contact(s) supplémentaire(s)

Caractéristiques

Type de base de données

Type de base de données

Study databases

Base de données issues d'enquêtes, précisions

Not-repeated cross-sectional studies (except case control studies)

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle

No

Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon

Online recruitment of participants

Objectif de la base de données

Objectif principal

Intravenous injection is the major mode of transmission of HCV among drug users, not only by needle sharing but also by the preparation equipment (container, filter, buffer, water), potentially contaminated by the blood of a contaminated person.

According to various sources, in recent years there have been significant changes in the patterns and practices of drug use in France, under the combined effect of the massive distribution of opiate substitution treatments (high-dose buprenorphine or BHD) from 1995 and the introduction of a wide variety of stimulants, including cocaine and synthetic drugs.

Often unplanned and practiced by a third party "initiator", the first injections present a high risk of contamination for the young initiate, often not well acquainted with injection techniques and the infectious risks and not in contact with first-line medical support structures.

In this context, a survey was put in place to identify the circumstances and practices of the first injection(s) among young drug users in France. An online methodology using the Internet has been developed to provide access and thus to discover user profiles that escape the more "classic" observation systems, especially those that are socially integrated or that are not in contact with support structures.

Critères d'inclusion

Be over 15 years old. Individuals who had never injected drugs were redirected to a short version of the questionnaire.

Type de population

Age

Adolescence (13 to 18 years)
Adulthood (19 to 24 years)
Adulthood (25 to 44 years)
Adulthood (45 to 64 years)

Population concernée

General population

Pathologie

Sexe

Male
Woman

Champ géographique

National

Détail du champ géographique

France

Collecte

Dates

Année du premier recueil

October 2010

Année du dernier recueil

March 2011

Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus) [500-1000] individuals

Détail du nombre d'individus 449 injectors and 455 non-injectors

Données

Activité de la base Data collection completed

Type de données recueillies Declarative data

Données déclaratives, précisions Internet self-questionnaire

Détail des données déclaratives recueillies Sociodemographic data, uses of psychoactive substances, practices and attitudes related to the first injection, HIV and HCV infection

Existence d'une biothèque No

Paramètres de santé étudiés Health event/morbidity
Others

Autres, précisions Uses of psychoactive substances, practices and attitudes related to the first injection

Modalités

Mode de recueil des données Internet. Promotion of the survey via a campaign of web banners, posters in cart-com format, articles and press releases.

Procédures qualité utilisées Pre-test of tools and questionnaire for intravenous drug users. Verification and cleaning of the database in Stata.

Suivi des participants No

Pathologie suivies

Appariement avec des sources administratives No

Valorisation et accès

Valorisation et accès

Lien vers le document <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23726980>

Description	Practices related to the first injection according to the key periods of the risk reduction policy in France. Article published in Drug and Alcohol Dependence.
Lien vers le document	http://www.federationaddiction.fr/actal-n10-decembre-2011-hepatites-de-reelles-avancees/
Description	The first injection in the risk reduction prism. Article published in the Actal journal of the Fédération Addiction.
Accès	
Existence d'un document qui répertorie les variables et les modalités de codage	No
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	On request from Pierre Arwidson, Director of Scientific Affairs at Inpes.
Accès aux données agrégées	Access on specific project only
Accès aux données individuelles	Access on specific project only