

# - Etude longitudinale sur des patients souffrant de depression sévère : étude de l'impulsivité

Responsable(s) :Falissard Bruno, Inserm U1018 - Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations Équipe: Genre, Santé sexuelle et Reproductive  
Corruble Emmanuelle, INSERM U669 CHU DE BICETRE - SERVICE DE PSYCHIATRIE

Date de modification : 05/09/2017 | Version : 1 | ID : 4533

## Général

### Identification

Nom détaillé Etude longitudinale sur des patients souffrant de depression sévère : étude de l'impulsivité

### Thématiques générales

Domaine médical Psychologie et psychiatrie

Pathologie, précisions Dépression

Déterminants de santé Facteurs sociaux et psycho-sociaux

Mots-clés tentatives suicide, étude psychométrique, impulsivité, échelle

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable Falissard

Prénom Bruno

Adresse CESP

Téléphone + 33 (0)1 58 41 58 50

Email falissard\_b@wanadoo.fr

Laboratoire Inserm U1018 - Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations Équipe: Genre, Santé sexuelle et Reproductive

Organisme INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE -

Nom du responsable Corruble

Prénom Emmanuelle

Adresse 94275 LE KREMLIN BICETRE

|             |   |
|-------------|---|
| Téléphone   | + 33 (0)1 45 21 25 24                                     |
| Email       | emmanuelle.corruble@bct.aphp.fr                           |
| Laboratoire | INSERM U669 CHU DE BICETRE - SERVICE DE PSYCHIATRIE       |
| Organisme   | INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche |

## Collaborations

## Financements

|              |          |
|--------------|----------|
| Financements | Publique |
|--------------|----------|

|            |        |
|------------|--------|
| Précisions | Public |
|------------|--------|

## Gouvernance de la base de données

|   |  |
|---|--|
| Organisation(s) responsable(s) ou promoteur | INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale |
| Statut de l'organisation                    | Secteur Public   |

## Contact(s) supplémentaire(s)

## Caractéristiques

### Type de base de données

|   |  |
|---|--|
| Type de base de données   | Bases de données issues d'enquêtes   |
| Base de données issues d'enquêtes, précisions   | Etudes transversales répétées (hors enquêtes cas-témoins)  |
| Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle | Non  |
| Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon                      | Patients nouvellement hospitalisés pour motif de dépression majeure (DSM-IV) et acceptant de participer à l'étude. |

### Objectif de la base de données

|                    |  |
|--------------------|--|
| Objectif principal | Etudier la relation entre dépression sévère et impulsivité et le rôle de cette impulsivité dans les tentatives de suicide. |
|--------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Critères d'inclusion | Patients nouvellement hospitalisés pour motif de dépression majeure (DSM-IV)<br>Critères d'exclusion: troubles bipolaires, troubles schizophréniques, abus d'alcool ou de drogue, troubles neurologiques. |
|----------------------|---|

## Type de population

|     |  |
|-----|--|
| Age | Adulte (19 à 24 ans)<br>Adulte (25 à 44 ans)<br>Adulte (45 à 64 ans) |
|-----|--|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Population concernée | Sujets malades |
|----------------------|----------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| Sexe | Masculin<br>Féminin |
|------|---------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Champ géographique | National |
|--------------------|----------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Détail du champ géographique | France (Service Psychiatrie, Kremlin-Bicêtre) |
|------------------------------|---|

## Collecte

### Dates

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Année du premier recueil | 2002 |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Année du dernier recueil | 2006 |
|--------------------------|------|

### Taille de la base de données

|  |                 |
|--|-----------------|
| Taille de la base de données (en nombre d'individus) | < 500 individus |
|--|-----------------|

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Détail du nombre d'individus | 127 patients |
|------------------------------|--------------|

### Données

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Activité de la base | Collecte des données terminée |
|---------------------|-------------------------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Type de données recueillies | Données cliniques |
|-----------------------------|-------------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Données cliniques, précisions | Examen médical |
|-------------------------------|----------------|

|  |  |
|--|--|
| Détail des données cliniques recueillies | Age, sexe, type de dépression, traitement, tentative de suicide. Évaluation de l'impulsivité ( Impulsivity Rating Scale, Barratt Impulsivity Scale, Impulse Control Scale) |
|--|--|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Existence d'une bibliothèque | Non |
|------------------------------|-----|

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Paramètres de santé étudiés | Événements de santé/morbidité |
|-----------------------------|-------------------------------|

## Evénements de santé/mortalité

### Modalités

Mode de recueil des données      Selon les échelles de mesure:- L'échelle d'évaluation de l'impulsivité (IRS). Elle comprend sept éléments évalués en quatre degrés.Elle a été testée pour la totalité de l'échantillon par un seul évaluateur.- L'Échelle d'impulsivité Baratt (BRI) est divisée en quatre degrés de 30 items.Elle a été testée par le premier sous-groupe de 50 patients (la version 11 du questionnaire a été utilisée)- L'échelle du contrôle des impulsions (ICS) est une échelle d'impulsivité en auto-évaluation, qui comprend 15 articles en quatre degrés (0-3). Elle a été testée par la deuxième sous-groupe de 77 patients.

Suivi des participants      Oui

Modalités de suivi des participants      Suivi par contact avec le médecin référent ? traitant

Détail du suivi      Suivi pendant 28 jours suite à l'inclusion

Appariement avec des sources administratives      Non

### Valorisation et accès

### Valorisation et accès

Lien vers le document      [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=impulsivity+AND+depression+AND+Falissard+B+\[Author\]](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=impulsivity+AND+depression+AND+Falissard+B+[Author])

Description      Liste des publications dans Pubmed

### Accès

Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)      Contacter le responsable scientifique

Accès aux données agrégées      Accès restreint sur projet spécifique

Accès aux données individuelles      Accès restreint sur projet spécifique