IPhODIA - Etude cas-témoins : impact d'un protocole d'informations délivrées en pharmacie d'officine sur l'adhésion des patients diabétiques de type II à leur traitement oral

Responsable(s) :Dejager Sylvie, MSD France

Date de modification : 04/10/2017 | Version : 1 | ID : 73344

Général

Identification

Nom détaillé	Etude cas-témoins : impact d'un protocole d'informations délivrées en pharmacie d'officine sur l'adhésion des patients diabétiques de type II à leur traitement oral
Sigle ou acronyme	IPhODIA

Thématiques générales

Domaine médical	Endocrinologie et métabolisme
Pathologie, précisions	Diabète
Déterminants de santé	Autres (précisez)
Autres, précisions	Observance du traitement.
Mots-clés	entretiens pharmaceutiques

Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable	Dejager
Prénom	Sylvie
Adresse	34 Avenue Léonard de Vinci 92418 Courbevoie Cedex
Téléphone	+33 1 80 46 40 00
Email	sylvie.dejager@merck.com
Laboratoire	MSD France

Collaborations

Financements

Financements	Privé

Précisions	MSD France
Gouvernance de la base de données	
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur	MSD France
Statut de l'organisation	Secteur Privé
Contact(s) supplémentaire(s)	
Caractéristiques	
Type de base de données	
Type de base de données	Bases de données issues d'enquêtes
Base de données issues d'enquêtes, précisions	Etudes cas-témoins
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle	Oui
Précisions	Intervention au niveau individuel
Objectif de la base de données	
Objectif principal	Décrire et comparer versus la pratique habituelle, l'impact à 6 mois d'une information délivrée par le pharmacien sur l'observance des traitements antidiabétiques oraux par les patients diabétiques de type II. Cette information sera délivrée au cours de 3 entretiens spécifiques.
Critères d'inclusion	Inclusion : Pour être inclus dans l'essai, les patients devront être des hommes ou femmes, âgés de plus de 18 ans, présentant un diabète de type II, traités par 3 antidiabétiques oraux au maximum et dont le taux d'HbA1c est supérieur à 7% de l'hémoglobine totale. Les patients devront être clients de la pharmacie depuis plus de 6 mois. Non-inclusion : Ne peuvent être inclus dans l'étude les patients diabétiques de type II atteints d'une pathologie tumorale maligne, traités par insuline ou antidiabétiques injectables, par plus de 3 antidiabétiques oraux ou bénéficiant de la délivrance de leur traitement antidiabétique oral sous forme de

	conditionnement trimestriel. Sont également exclus de l'étude tous les patients diabétiques ne souhaitant pas participer à l'étude, ceux participant ou ayant au préalable une pathologie psychiatrique sévère ou ayant une maîtrise insuffisante de la langue française.
Type de population	
Age	Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans) Personnes âgées (65 à 79 ans) Grand âge (80 ans et plus)
Population concernée	Sujets malades
Pathologie	E11 - Diabète sucré, type 2
Sexe	Masculin Féminin
Champ géographique	National
Détail du champ géographique	France
Collecte	
Dates	
Taille de la base de données	
Taille de la base de données (en nombre d'individus)	[500-1000[individus
Détail du nombre d'individus	600
Données	
Activité de la base	Collecte des données terminée
Type de données recueillies	Données cliniques Données déclaratives Données biologiques
Données déclaratives, précisions	Auto-questionnaire papier Face à face
Données biologiques, précisions	HbA1c, LDL, Tension Artérielle.
Existence d'une biothèque	Non

Modalités	
Suivi des participants	Oui
Détail du suivi	Patients suivis par les pharmaciens.
Appariement avec des sources administratives	Non

Valorisation et accès

Valorisation et accès	
Accès	
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition)	Pas de charte d'accès aux données
Accès aux données agrégées	Pas d'accès
Accès aux données individuelles	Accès pas encore planifié