

# ZOMAJET - Etude longitudinale sur l'observance globale et de la durée de traitement par ZOMACTON® avec le stylo transjecteur ZOMAJET®

Responsable(s) :BAHBAH Farah

Date de modification : 09/05/2011 | Version : 2 | ID : 2526

## Général

### Identification

Nom détaillé	Etude longitudinale sur l'observance globale et de la durée de traitement par ZOMACTON® avec le stylo transjecteur ZOMAJET®
Sigle ou acronyme	ZOMAJET
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.)	907122 (CNIL)

### Thématiques générales

Domaine médical	Endocrinologie et métabolisme Pédiatrie
Déterminants de santé	Produits de santé
Mots-clés	Somatropine, zomacton, zomajet vision X, Zomajet 2 vision

### Responsable(s) scientifique(s)

Nom du responsable	BAHBAH
Prénom	Farah
Adresse	Laboratoire Ferring SAS. 7 Rue jean-baptiste clement. 94250 Gentilly
Email	Farah.Bahbah@ferring.com
Organisme	FERRING

### Collaborations

### Financements

Financements	Privé
Précisions	Laboratory Ferring SAS

## Gouvernance de la base de données

Organisation(s) responsable(s) ou promoteur Laboratoire FERRING SAS

Statut de l'organisation Secteur Privé

## Contact(s) supplémentaire(s)

## Caractéristiques

### Type de base de données

Type de base de données Bases de données issues d'enquêtes

Base de données issues d'enquêtes, précisions Etudes longitudinales (hors cohortes)

Origine du recrutement des participants Via une sélection de services ou établissements de santé

Critère de sélection des participants Prise de produit(s) de santé

Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle Non

Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon Tous les patients, répondant aux critères de la Fiche d'Information Thérapeutique (déficit en hormone de croissance ou syndrome de Turner), pour lesquels est initié un traitement par Zomacton® 4 mg avec le stylo transjecteur Zomajet® 2 Vision ou par Zomacton® 10 mg avec le stylo transjecteur Zomajet® Vision X lorsque ce dernier aura reçu son Autorisation de Mise sur le Marché.

## Objectif de la base de données

Objectif principal Évaluer avec une précision suffisante le taux d'observance globale au traitement sur une période maximale de trois ans.  
L'étude est réalisée à la demande des autorités.

Critères d'inclusion Tous les patients, répondant aux critères de la Fiche d'Information Thérapeutique (déficit en hormone de croissance ou syndrome de Turner), pour lesquels est initié un traitement par Zomacton® 4 mg avec le stylo transjecteur Zomajet® 2 Vision ou par Zomacton® 10 mg avec le stylo transjecteur

Zomajet® Vision X lorsque ce dernier aura reçu son Autorisation de Mise sur le Marché.

## Type de population

Age  
Petite enfance (2 à 5 ans)  
Enfance (6 à 13 ans)  
Adolescence (13 à 18 ans)

Population concernée  
Sujets malades

Sexe  
Masculin  
Féminin

Champ géographique  
National

Détail du champ géographique  
National

## Collecte

### Dates

Année du premier recueil  
2007

Année du dernier recueil  
2011

### Taille de la base de données

Taille de la base de données (en nombre d'individus)  
< 500 individus

Détail du nombre d'individus  
90

## Données

Activité de la base  
Collecte des données terminée

Type de données recueillies  
Données cliniques  
Données déclaratives  
Données paracliniques  
Données biologiques

Données cliniques, précisions  
Dossier clinique

Données déclaratives, précisions  
Face à face

Données paracliniques, précisions  
Paramètres Auxologiques (gain de taille, ...)

Données biologiques, précisions  
IGF-1 si disponible

Existence d'une bibliothèque	Non
Paramètres de santé étudiés	Evénements de santé/morbidité Consommation de soins/services de santé
Consommation de soins, précisions	Produits de santé
<b>Modalités</b>	
Mode de recueil des données	Questionnaire à l'initiation du traitement (visite d'initiation) : Identification du questionnaire ; date de visite ; critère d'inclusion (Fiche d'Information Thérapeutique Initiale) ; données patient : sexe, date de naissance, taille, poids, âge osseux (selon l'atlas de Greulich et Pyle), gain de taille avant traitement, stade pubertaire (selon Tanner), antécédents ; indication (déficit en GH ou syndrome de Turner avec caryotype), cause du déficit en GH, exploration du déficit en GH (IGF-1 si disponible, tests de stimulation et résultats, perturbations hormonales ou endocriniennes associées) ; Traitement prescrit ; Posologie et modalités d'administration. Questionnaires de suivi (1 visite de suivi environ tous les 3 à 6 mois) : Identification du questionnaire ; date de visite ; taille, poids, âge osseux, stade pubertaire, glycémie à jeun et IGF-1 (si disponibles) ; Traitement administré comme prescrit (oui/non) - si non, traitement administré par intermittence, arrêt du traitement et motif(s) d'inobservance ; Traitement arrêté par le médecin (oui/non) - si oui, date et motif(s) - si non, difficultés techniques d'utilisation du stylo (oui/non) ; modification des modalités d'administration (oui/non) : nouveau dosage et/ou nouvelle posologie et/ou nouvelle tête du stylo transjecteur et motif(s). Tolérance locale et générale.
Suivi des participants	Oui
Détail du suivi	minimum 1 an et 4 ans au total
Appariement avec des sources administratives	Non
<b>Valorisation et accès</b>	
<b>Valorisation et accès</b>	
<b>Accès</b>	
Charte d'accès aux données (convention de mise à	Rapport Clinique. Pour toute demande d'information sur l'étude

disposition, format de données  
et délais de mise à disposition)

ZOMAJET, merci de contacter : Dr Mustapha-Kamal  
BENGUERBA

Accès aux données agrégées

Accès restreint sur projet spécifique

Accès aux données individuelles

Accès restreint sur projet spécifique